© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tauschverein.

Auf mehrfaches Gesuch um Angabe des Vorraths gewisser Genera erfolgen heute 2 derselben; die mit * versehenen sind nur schwach vertreten; von diesen und allen nicht angeführten Species übernimmt der Tauschverein von 10 bis 50 Stück im Tausch oder gegen baar, und ersucht um Listen.

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

NB. A. bedeutet Anglia; Ge. = Germania; Ga. = Gallia; It. = Italia; Ir. = Irlandia; Tr. = Transsylvania; B. = Bavaria; C. = Carinthia; D. = Dalmatia.
(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	Mk.		Mk.
Pupa.		pusilla, Müll. Ge. A.	0,5
amicta, Parr. It. septentr.	0,15	*pyrenearia, Boubée Ga. mer.	0,15
angustior, Jeffr. „	0,10	pygmaea, Drp. Ge. Tr.	0,5
antivertigo, Drp. A. Ir. Ge.	0,10	quinquedentata, Born. Pisa	0,15
avenacea, „ Ge. merid. It.	0,10	Ressmanni, Villa C.	0,15
— var. transiens ad mega-		*ringens, Mich. Ga. merid.	0,30
chilon Tirol	0,20	secale, Drp. A. u. Ge. merid.	0,10
bergamensis, Charp. It. sept.	0,10	*Sterrii, Voith B.	0,15
*Boileausiana, „ Gemerid.	0,40	Strobeli Gred. Tirol	0,10
cinerea, Drp. It. u. do.	0,15	triplicata, Stud. „	0,20
claustralis, Gred. Tirol	0,30	truncatella, Pfr. C.	0,10
*costulata Nils. Ge. Schwed.	0,30	umbilicata, Drp. A. Dr.	0,10
*dilucida, Zgl. It. septen	0,20	variabilis, Drp. Gallia mer.	0,15
doliolum, Brug. Ge. u. Tirol	0,10	ventrosa, Heynem. Frkft a. M.	0,20
dolium, Drp. C.	0,20	*Klunzingeri, Jick. Abyssinia	0,50
edentula, „ A. Ga.	0,5	Reinhardti, „ „	0,40
Ferrari, Porro, It. septen.	0,20	*bisulcata, „ „	0,50
frumentum, Drp. Ge.	0,10	lardea, „ „	0,40
— v. elongata, Rssm. Tirol	0,15	fontana Krauss „	0,40
— v. illyrica, „ „	0,15	*Clausilia.*	
Kokeilii, Rssm. C.	0,50	agnata, Partsch, D. u. Croatia	0,25
megachilos, Jan. Tirol	0,15	almissana, Küst. D.	0,25
*—v. bigorriensis, Charp. Ga.	0,15	asphaltina, Zgl. C.	0,20
minutissima, Hartm. Tirol	0,20	Bergeri, Meyer C.	0,25
muscorum, L. Ge. It.	0,5	Bielzi, Parr. Tr.	0,20
*Mühlfeldi, Küst. D.	0,25	bilabrata, Edg. Smith Japan	1
Philippii, Cantr. Athen	0,15	biplicata, Montg. Ge. A.	0,10

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
biplicata v. bohemica, Cls. Bh.	0,25	itala v. pura, Tirol.	0,25
bogatensis, Bielz Tr.	0,20	japonica, Crosse var. nipponensis, Kob. Japan	2
*Boissieri, Charp. Syria	0,35	*Kephissiae, Roth Parnass	0,40
cana, Held Tr.	0,10	laminata, Montg. Tr.	0,10
— v. farta, A. Schm. Tr.	0,15	— v. alpestris, Blz. Tr.	0,20
— v. transylvanica Blz. „	0,15	*latestriata, Blz. „	0,25
— v. iostoma, A. Schm. „	0,20	leucostigma, Zgl. It.	0,20
canescens, Parr. „	0,20	v. candilabris, Porro. It.	0,20
— v. glabrata, Blz. „	0,25	— v. opalina Zgl. „	0,20
cincta, Bruma. C.	0,20	lincolata, Held Ge.	0,25
concilians, A. Schm. Tr.	0,20	Lischkeana, Parr. Tr.	0,25
*cruciata, Stud. B.	0,30	— v. livens, Blz. „	0,30
— minor, Silesia	0,25	macarana, Zgl. D.	0,20
dacia, Friv. Bosnia	0,20	*madensis, Fuss Tr.	0,30
*dalmatina, Partsch. D.	0,25	maesta, Fér. Palestina.	0,35
*decipiens, Zel. (Rssm.) It.	0,30	*mamertina, Gulia. Gozzo.	9
dubia Drp. Tr.	0,20	marginata, Zgl. Tr.	0,20
elata, Ziegler „	0,20	Marisii, A. Schm. „	0,20
— v. major, Blz. „	0,25	*Menelaos, Sparta	0,35
elegans, Blz. „	0,25	*Meschendorferi, Blz. Tr.	0,35
*— v. cerasina, Blz. „	0,30	montana, Stenz „	0,25
exarata, Zgl. D.	0,20	*nigricans, Pult. A. u. Ge.	0,20
fallax, Rssm. Tr.	0,20	*olympica, Friv. Olymp	0,30
filograna, Zgl. „	0,25	ornata, Zgl. Styria, Croatia	0,20
fimbriata, Mühlf. C.	0,25	Orsiniana, Villa, It.	0,40
formosa, Zgl. D.	0,25	orthostoma, Mnke. Tr.	0,20
fusca, de Betta It. septentr.	0,20	*pachychila, Pfr. D.	0,35
Fussiana, Blz. Tr.	0,20	pagana, Zgl. Tr.	0,20
— v. grandis, Blz. „	0,25	papillaris Mühlf. It.	0,20
— v. pruinosa, „ „	0,20	parvula, Stud. Ge. u. Norweg.	0,20
*gibbula, Zgl. D.	0,30	patula, Charp. Attica	0,30
gracilis, Rssm. Ge. merid.	0,20	Pfeifferi, Küst. D.	0,25
graeca, Pfr. Argos.	0,35	piceata, Zgl. var. D.	0,25
grisea, Desh. Nauplia.	0,20	platydera, v. Mart. Japan	0,70
incisa, Küster It. septentr.	0,30	plicata, Drp. C.	0,20
interrupta, Zgl. C.	0,20	— v. costata, Wallachei	0,35
— v. diaphana, Rssm. C.	0,25	— v. implicata, Bz. Tr.	0,25
*istriana F. J. Schm. Istria.	0,25	*plicatula, Drp. Carniola	0,15
itala v. Mart. It. septentr.	0,20		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
plumbea, Rssm. Tr.	0,20	NB. Die früher angezeigte	
— v. cornea, Bz. Tr.	0,20	Clausilia gulo Rossm. ist nach	
pumila Zgl. B. Tr.	0,20	Dr. Böttger = turgida, Zgl.	
*punctulata, Küst. Calabria	0,35	*Baleo-Clausilia.*	
regalis Blz. Tr.	0,25	Haueri, Blz. Tr.	0,25
— v. Wallachiensis Bz. Wall.	0,25	glauca, Blz. „	0,25
Reiniana, Kob. Japan	1,50	— v. costata, Blz. „	0,30
Rolphii, Leach. C. u. 7 Gebirge	0,25	— v. latens, Fér. „	0,25
Rossmässleri, Pfr. C.	0,30	— v. minor. Blz. „	0,20
rugicollis, Zgl. Tr.	0,25	lactea, Blz. „	0,30
— v. banatica, Blz. Banat	0,25	— v. glorifica, Parr. „	0,30
— v. oleata, Rssm. C.	0,25	livida, Mnke. „	0,20
Schmidtii, Pfr. var. rablensis, Gallenst. C.	0,25	— v. costiculata „	0,35
*socialis, Friv. Varna	0,30	— v. Blz. „	0,25
solida, Drp. It. sept. Ga. mer.	0,30	*Helix.*	
— v. mofellana, Parr. It.	0,30	acuta, Müll. It. sept.	0,05
Spreafici Pini. It. septentr.	0,30	ammonis, A. Sch. „	0,15
Stabilei, Charp. „	0,35	— varietas „	0,20
*stabilis, Zgl. Tr.	0,30	apennina, Porro Apenn.	0,25
Stenzii Rssm. C. Tr.	0,30	bathyomphala, Chrp. u. v. „	0,30
straminicollis Parr. Tr.	0,20	bella, Pfr. Ind. orient.	1.25
— v. occidentalis Tr.	0,25	coelata, Stud. Ge. mer.	0,25
strigillata, Mühlf. D.	0,25	frigida, v. insubr., Jan. It. spt.	0,25
*styriaca, A. Schm. Styria	0,25	frigidissima, Admi. n. sp. It. spt.	0,50
sulcosa Zgl. D.	0,15	ligata, Müll. var. „	0,20
tau, Böttger Japan	0,60	nebrodensis, Piraj „	0,25
*transsylvanica, Zgl. Tr.	0,35	planospira, Lam. v. & v. etrusca Adami. It. sept.	0,25
tridens, Chm. Portorico	0,80	profuga A. Schm. v. „	0,15
tumida, Zgl. Tr.	0,35	pisana, Müll. var. „	0,10
turgida, Zgl. Tr.	0,35	pyramidata, Drp. „	0,10
ungulata, Zgl. Carniola	0,25	serpentina, Jan. v. „	0,20
varians Zgl. C.	0,25	setipila, Zgl. „	0,45
ventricosa, Drp. C.	0,25	strigata, Müll & v. „	0,25
*vetusta, Ziegl., Carniola	0,30	— v. Molteni, Admi. „	0,50
*vibex, Rssm. v. obesa, Pfr. D.	0,30	tenuilabris, Braun, Regensbg.	0,50
*Voithii, Rssm. Grecia	0,35	tigrina, Jan. Italien	0,25
ossetica, A. Schm. Kaukasus	1,50	Pupina artata, Bens. Birma	0,50
foreicollis, Parr. „	1,—	Daudebardia rufa, Stz. B.	1,20
Duboisi, Chrp. „	0,60	Vitrella acicula, Held. B.	1,10

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Vitrella pellucidaCrnz. Baden	1,10	Natica melanost. Gmel. O.in.	0.40
Planorbis Clss.,Wstrl. Galizia	0,50	Litorina undulata,GrayIn.or.	0,25
Neritina pelopon.Bck.Euboea	0,15	Thalotia conica Sow. „	0,35
Bithynia Ors., Chrp. Lepante	0,25	Haliotis asinina, L. „	0,60
Anodonta idrina, Spin. It.	0,40	Patella saccharina L. „	0,35
Unio Spinellii, Villa It.	0,40	Solen Deless., Chm. Pto. Cab.	0,45
— marginalis, Lm. Ganges	1.—	Tellina vulsella. Lm. Zebu	0,90
— — var. „ „	1.—	Venus ovum, Hanl. Oc. ind.	0,45
— birmanus, Blf. Birma	1,50	Circe dispar, Ch. „	0,50
Corbicula occiens,Bns. O.ind.	0,35	Cardium austr. Rve. Maurit.	0,40
— striatella, Desh. „	0,35	— areniculum „ „	0,80
Nassa subspinosa,Lm. O. ind.	0,40	— lacunosum „ „	0,40
Eburna spirata, L. „	1.—	— rugosum, Lm. „	0,40-50
Purpura Rudolphi, Lm. „	1,20	— serratum, „ „	0,60
Ricinula horrida, Lm. „	0,75	— muricatum, L. W.-Ind.	0,25
Mitra cinctella „ „	1.—	— magnum, Lm. Ma. rub.	0,25
— amphorella „ „	0,50	Hemicardium card.,L. Oc.ind.	1.—
Marg. diaphana, Kn. Ind. occ.	0,20	Cardita bicolor „	1.80
Cassis canaliculata,Gml.O.in.	1.—	Perna costell.,Conr. Sandw. I.	1.—

Literaturbericht.

Annula Report of the Trustees of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College in Cambridge for 1876.

Dem Bericht über die conchologische Abtheilung entnehmen wir die Notiz, dass die conchologische Sammlung jetzt 11,312 Arten Univalven zählt, eine Zahl, welche von wenig Sammlungen in Europa übertroffen werden mag; die Bivalven sind noch nicht catalogisirt.

Döring, Dr. Ad., Aprintes sobre la Fauna de Moluscos de la Republika Argentina. Tercera Parte. Cordoba 1876.

Als neu beschrieben werden: Patula Strobeliana, Stelzneriana, Eurycampta Hidalgonis, Plagiodontes n. subg. Odostomorum; Brackebuschii, Weyemberghii; Odontostomus Achalanus, Popanus, Aconjigastanus, multispiratus, Bergii, salinicola, Chancaninus, Champaquianus, reticulatus, Borus d'Orbignyi, Lorentzianus. Die neuen Arten sind vom Autor sämmtlich für die Normalsammlung eingeschickt worden und kommen im nächsten Jahrgange der Jahrbücher zur Abbildung.